
Catalogus floragericht beheer gemeente Zoetermeer



gemeente Zoetermeer
Versie februari 2010



Inhoud

	Pagina
Achtergrond	3
Maaitijdstip mei	
1x Maaien bollen vlakgras (krokussen).....	5
Maaitijdstip juni	
1x Maaien bollen vlakgras (narcissen).....	7
1x Maaien ruiggras (zomergazon).....	8
2x Maaien ruiggras 1 ^{ste} maaironde.....	9
2x Maaien ruiggras (margrietten) 1 ^{ste} maaironde.....	10
Maaitijdstip augustus	
1x Maaien ruigte om het jaar.....	12
1x Maaien ruiggras.....	13
Maaitijdstip september	
1x Maaien ruiggras.....	15
2x Maaien ruiggras 2 ^e maaironde.....	16
Overzicht mairegimes	17

Achtergrond

De catalogus floragericht beheer is opgesteld voor alle hooilanden met ruig gras in de gemeente Zoetermeer. De catalogus is ingedeeld in kalendermaanden. Onder de vernoemde maand zijn de betreffende maairegimes terug te vinden waarin percelen omstreeks die tijd gemaaid moeten worden. De gekleurde balk aan de rechterzijde van de pagina correspondeert met de kleur van het maairegime op de tekening.

Een pagina uit de catalogus is opgebouwd uit beeldmateriaal in combinatie met prestatieomschrijvingen. Allereerst zijn van herkenbare soorten beelden weergegeven. Het beeldmateriaal geeft een weergave van de gehele plant, de zaadzetting en het maaimoment. De belangrijkste beelden voor de opdrachtnemer zijn de beelden van het maaimoment, de overige beelden vergemakkelijken de herkenning van de plant. Onder deze beelden staat de Nederlandse en wetenschappelijke benaming van de plant vermeld. De maanden duiden op de bloei maanden van de plantsoort. De herkenbare soorten kunnen bestaan uit beschermde soorten, Rode lijst soorten, ken- en sierlijke soorten. Onder sierlijke soorten vallen visueel aantrekkelijke planten welke graag gezien worden door burgers. De beschermde soorten worden landelijk beschermd door de Flora- en faunawet. Zoetermeer heeft haar eigen gedragscode ontwikkeld waarin deze soorten ook in acht worden genomen. De Rode lijst soorten worden in de gedragscode bij bestendig beheer en onderhoud behandeld als tabel 2 soorten.





In het geval van een kensoort wordt er onderscheid gemaakt tussen kensoorten van het glanshaver-, kamgras-, en dotterbloemverbond. Deze verbonden in de gemeente Zoetermeer worden in deze catalogus afgekort met de initialen: GH, KG en DB.

Een overzichtsfoto geeft een referentiebeeld van de percelen op het geschikte maaimoment weer. In de catalogus kan de overzichtsfoto afwijken van de werkelijkheid, de herkenbare soorten zijn wel op elk perceel terug te vinden.

Het groene kader aan de onderzijde van elke pagina, geeft de prestatie-eis weer. Hierin zijn de maatregelen, het verwachte maaitijdstip en de maaironde vernoemd. De monitoring van de werkzaamheden door de opdrachtgever, vindt plaats op basis van deze prestatieomschrijvingen. De prestatie-eis is leidend en wordt ondersteund door de beelden.



mei

Gehele plant		
Zaadzetting	n.v.t.	n.v.t.
Maaimoment		

Sierlijke soort:
Crocus cultivars -
krokus

Sierlijke soort:
Crocus cultivars -
krokus

bloeitijdstip

februari en maart

februari en maart



Afbeelding: overzichtsfoto van het maaimoment.

1x maaien en afvoeren bollen vlakgras (krokussen).

Maatregelen: 1 keer maaien en afvoeren.

Verwacht maaitijdstip: Medio mei.

Maaironde: Maaien binnen één week nadat 100% van het loof bruinverkleuring vertoont.





Bijzonderheden: Na maaibeurt behandelen als vlakgras.

1x Maaien bollen vlakgras (krokussen)

Bestekspost: 341010



juni

Gehele plant		
Zaadzetting	n.v.t.	n.v.t.
Maaimoment		

Sierlijke soort:
Narcissus cultivars - narcis

Sierlijke soort:
Narcissus cultivars - narcis

bloeitijdstip

maart en april

maart en april



Afbeelding: overzichtsfoto van het maaimoment.

1x maaien en afvoeren bollen vlakgras (narcissen).

- Maatregelen: 1 keer maaien en afvoeren.
- Verwacht maaitijdstip: Medio juni.
- Maaironde: Maaien binnen vier weken nadat 100% van het loof bruinverkleuring vertoont.
- Bijzonderheden : Na maaibeurt behandelen als vlakgras.

1 x Maaien bollen vlakgras (narcissen)

Bestekspost: 341030



Sierlijke soort:

Dactylis glomerata -
kropaar

Kensoort GH:

Arrhenatherum alatum -
glanshaver

Kensoort GH-KG- DB:

Holcus lanatus -
gestreepte witbol

bloeitijdstip mei t/m augustus

mei t/m september

mei t/m september



Afbeelding: overzichtsfoto van het maaimoment.

1x maaien en afvoeren ruiggras (Zomergazon).

Maatregelen: 1 keer maaien en afvoeren.

Verwacht maaitijdstip: Medio juni.

Maaironde: Maaien binnen vier weken nadat de kroopaar voor 50% in het zaad staat, de aren van de glanshaver en gestreepte witbol staan op dit moment voor 50% open.

Bijzonderheden : Na maaibeurt behandelen als vlakgras.



Kensoort GH-KG- DB:

Holcus lanatus -
gestreepte witbol

Kensoort GH:

Arrhenatherum alatius -
glanshaver


Sierlijke soort:

Cerastium fontanum -
gewone hoornbloem

bloeitijdstip mei t/m september

mei t/m september

april t/m herfst



Afbeelding: overzichtsfoto's van het maaimoment.

2x maaien en afvoeren ruiggras- 1^{ste} maaironde.

Maatregelen: 2 keer maaien en afvoeren.

Verwacht maaitijdstip: Medio juni (week 24 t/m 27).

Maaironde: Maaien binnen vier weken nadat de aren van de gestreepte witbol en glanshaver voor 75% open staan. Op dit moment staat de gewone hoornbloem in bloei.

Maaiperiode: Vier aaneengesloten weken binnen week 22 t/m 29.



Sierlijke soort:
Leucanthemum vulgare -
 gewone margriet

bloeitijdstip mei t/m september



Afbeelding: overzichtsfoto's van het maaimoment.

2x maaien en afvoeren ruiggras (Margrietten) 1ste maaironde.

Maatregelen: 2 keer maaien en afvoeren van percelen waarin de gewone margriet op een oppervlakte van ten minste één are dominant (>50% bedekking) aanwezig is.

Verwacht maaitijdstip: Eind juni (week 26 t/m 29)

Maaironde: Maaien binnen vier weken nadat 50% van de gewone margrietten zaad heeft gevormd.

Maaiperiode: Vier aaneengesloten weken binnen week 22 t/m 29.



augustus

Gehele plant			
Zaadzetting			
Maaimoment			

Kensoort GH-KG:
Heracleum sphondylium -
gewone bereklauw

Kensoort GH-KG:
Dipsacus fullonum -
grote kaardenbol

Sierlijke soort:
Epilobium hirsutum -
harig wilgenroosje

bloeitijdstip mei t/m herfst

Juli t/m september

juni t/m september



Afbeelding: overzichtsfoto van het maaimoment.

1x maaien en afvoeren ruigte om het jaar

Maatregelen:	1 keer maaien en afvoeren om het jaar.
Verwacht maaitijdstip:	Medio augustus.(week 31-32)
Maaironde:	Maaien binnen twee weken nadat de grote kaardenbol voor 50% in het zaad staat, de grote bereklauw en het harig wilgenroosje zijn uitgebloeid.
Maaiperiode:	Twee aaneengesloten weken binnen week 30 t/m 33.

Bestekspost: 341110

1x Maaien ruigte om het jaar

Bestekspost: 341130

Gehele plant			
Zaadzetting			
Maaimoment			

Kensoort GH-KG:
Dactylorhiza majalis -
brede orchis

Kensoort GH-KG:
*Rhinanthus
alectorolophus* -
harige ratelaar

Kensoort GH-KG- DB:
Holcus lanatus -
gestreepte witbol

bloeitijdstip mei t/m juli

mei t/m juli

mei t/m september



Afbeelding: overzichtsfoto van het maaimoment.

1x maaien en afvoeren ruiggras.

Bijzondere ondergrond:	Zachte/natte ondergrond.
Maatregelen:	1 keer maaien en afvoeren.
Verwacht maaitijdstip:	Medio augustus. (week 31-32)
Maaironde:	Maaien binnen twee weken nadat de brede orchis en de harige ratelaar voor 50% hun zaad hebben laten vallen. De aren van de gestreepte witbol staan open.
Maaiperiode:	Twee aaneengesloten weken binnen week 30 t/m 33.

1x Maaien ruiggras

Bestekspost: 341070



september

Gehele plant			
Zaadzetting			
Maaimoment			

Kensoort GH-KG:

Pastinaca sativa
gewone pastinaak

bloeitijdstip juli t/m september

Kensoort GH-KG:

Daucus carota -
wilde peen

juni t/m herfst

Sierlijke soort:

Centaurea jacea -
Knoopkruid

juni t/m oktober



Afbeelding: overzichtsfoto van het maaimoment.

1x maaien en afvoeren ruiggras.

Maatregelen:	1 keer maaien en afvoeren.
Verwacht maaitijdstip:	Medio september. (week 37-40)
Maaironde:	Maaien binnen vier weken als de pastinaak voor 75% is uitgebloeid. Op dit moment is zowel de wilde peen als het knoopkruid voor 50% uitgebloeid.
Maaiperiode:	Vier aaneengesloten weken binnen week 35 t/m 42.

1x Maaien ruiggras

Bestekspost: 341090

Gehele plant			
Zaadzetting			
Maaimoment			

Kensoort GH-KG:

Daucus carota -
wilde peen

Sierlijke soort:

Centaurea jacea -
Knoopkruid

Sierlijke soort:

Heracleum sphondylium -
gewone bereklauw

bloeitijdstip juni t/m herfst

juni t/m oktober

juni t/m herfst



Afbeelding: overzichtsfoto van het maaimoment.

2x maaien en afvoeren ruiggras- 2^{de} maaironde.

Maatregelen: 2 keer maaien en afvoeren.

Verwacht maaitijdstip: Medio september. (week 37-40)

Maaironde: Maaien als het knoopkruid voor 50% is uitgebloeid.
Op dit moment staan zowel de peen als de gewone bereklauw voor 50% in het zaad.

Maaiperiode: Vier aaneengesloten weken binnen week 35 t/m 42.